

## Drug Facts (continued)

use of the product.  
• children under 2 years of age: do not use

## Other information

Store at 59° to 86° F (15° to 30° C)

## Inactive ingredients

Blue 1\* flavor, PEG-8, PEG-75, Red 3\*, Red 33\*, Red 40\*, sodium saccharin, Yellow 10\* \* contains one or more of these ingredients.

## Questions or comments?

1-800-835-0885 or 1-867-672-5500  
M-F 8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST.  
Visit [www.dentaltech.com](http://www.dentaltech.com)

## Información del Medicamento

**Ingredientes activos Propósito**  
Benzocaína 20% --- Anestésico oral  
Para el alivio temporal de irritaciones y dolores. Evite ocasionales, asociados con:

- Dolor de boca y garganta
- Procedimientos dentales menores
- Fricción de espiga
- Fricción de la boca y encías
- Causadas por dentaduras postizas o aparatos de ortodoncia

## Advertencias

### Advertencia metemoglobinemia

El uso de este producto puede causar metemoglobinemia, una condición que reduce la cantidad de oxígeno que puede transportar la sangre. Esto puede ocurrir incluso si usted ha utilizado este producto antes. Deje de usar y busque atención médica inmediata si usted o un niño en su cuidado desarrollan:  
• piel pálida, gris o de color azul (cianosis)

PM5525 REV.001

DENTAL TECHNOLOGIES, INC.  
Lincolnwood, IL 60712  
Made in U.S.A.

DO NOT USE IF PRINTED SEAL  
UNDER CAP IS BROKEN OR MISSING.

NO LO USE SI EL SELLO IMPRESO  
DEBAJO DE LA TAPA ESTÁ ROTO  
O FALTA.

DENTAL  
TECHNOLOGIES

[www.dentaltech.com](http://www.dentaltech.com)



20% Benzocaine Oral Anesthetic  
1 oz. (30g)



20% anestesia oral de benzocaína

## Drug Facts

### Active Ingredient Purpose

Benzocaine 20%... Oral Anesthetic

### Uses

For the temporary relief of occasional minor irritation and pain, associated with:

- Sore mouth and throat
- Ulcers

- Minor dental procedures
- Needle punctures
- Minor irritation of the mouth and gums caused by dentures or orthodontic appliances

### Warnings

For external use only  
**Metemoglobinemia warning**

Use of this product may cause metemoglobinemia, a serious condition that must be treated promptly because it reduces the amount of oxygen carried in blood. This can occur even if you have used this product before.

Stop use and seek immediate medical attention if you or a

- child in your care develops:  
• pale, gray, or blue colored skin (cyanosis)
- headache

- rapid heart rate
- shortness of breath
- dizziness or lightheadedness
- fatigue or lack of energy

**Allergy alert:** Do not use if you have a history of allergy to

any "caine" anesthetics, such as benzocaine, butacaine, procaine or tetracaine.

**Sore throat warning:** If sore throat is severe, persists for more than 2 days, is accompanied or followed by fever, headache, rash, nausea, or vomiting consult a doctor promptly. If sore mouth symptoms do not improve in 7

days, see your dentist or doctor promptly.  
**Do not use**  
• for teething  
• in children under 2 years of age

### When using this product

avoid contact with eyes

**If pregnant or breast-feeding,** ask a health professional before use.

### Keep out of reach of children.

In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

### Directions

- do not exceed recommended dosage.
- adults and children 2 years of age and older: apply to affected area. Gargle, swish around in the mouth, or allow to remain in place at least 1 minute and then spit out. Use up to 4 times daily or as directed by a dentist or doctor.

• children under 12 years of age: should be supervised in the

• dolor de espiga

• tirrido cardíaco rápido

• dificultad respirar

• fatiga o falta de energía

• fiebre o falta de energía

**Alerta de alergia:** No la use si tiene

alergia a los anestésicos con "caine", como

butacaina, benzocaína o

procaina.

**Advertencia de dolor de garganta:** si el

dolor de garganta es severo, persiste

durante más de 2 días, está

acompañado o seguido de fiebre, dolor

de cabeza, náusea, vómitos, consulte a un médico de

inmediato. Si los síntomas de la boca

dolorida no mejoran en 7 días, consulte

al dentista o doctor de inmediato.

• para la dentición

• niños menores de 2 años de edad

• niños menores de 12 años de edad

**Advertencia de metemoglobinemia**

El uso de este producto puede causar

metemoglobinemia, una condición que

reduce la cantidad de oxígeno que puede

transportar la sangre. Esto puede ocurrir

incluso si usted ha utilizado este

producto antes. Deje de usar y busque

atención médica inmediata si usted o un

niño en su cuidado desarrollan:

• piel pálida, gris o de color azul (cianosis)

• dolor de cabeza

• ritmo cardíaco rápido

• dificultad respirar

• fatiga o falta de energía

**Alerta de alergia:** No la use si tiene

alergia a los anestésicos con "caine", como

butacaina, benzocaína o procaina.

**Advertencia de dolor de garganta:** si el

dolor de garganta es severo, persiste

durante más de 2 días, está

acompañado o seguido de fiebre, dolor

de cabeza, náusea, vómitos, consulte a un

médico de inmediato. Si los síntomas de

la boca dolorida no mejoran en 7 días,

consulte al dentista o doctor de inmediato.

• para la dentición

• niños menores de 2 años de edad

• niños menores de 12 años de edad

**Advertencia de metemoglobinemia**

El uso de este producto puede causar

metemoglobinemia, una condición que

reduce la cantidad de oxígeno que puede

transportar la sangre. Esto puede ocurrir

incluso si usted ha utilizado este

producto antes. Deje de usar y busque

atención médica inmediata si usted o un

niño en su cuidado desarrollan:

• piel pálida, gris o de color azul (cianosis)

• dolor de cabeza

• ritmo cardíaco rápido

• dificultad respirar

• fatiga o falta de energía

**Alerta de alergia:** No la use si tiene

alergia a los anestésicos con "caine", como

butacaina, benzocaína o procaina.

**Advertencia de dolor de garganta:** si el

dolor de garganta es severo, persiste

durante más de 2 días, está

acompañado o seguido de fiebre, dolor

de cabeza, náusea, vómitos, consulte a un

médico de inmediato. Si los síntomas de

la boca dolorida no mejoran en 7 días,

consulte al dentista o doctor de inmediato.

• para la dentición

• niños menores de 2 años de edad

• niños menores de 12 años de edad

**Advertencia de metemoglobinemia**

El uso de este producto puede causar

metemoglobinemia, una condición que

reduce la cantidad de oxígeno que puede

transportar la sangre. Esto puede ocurrir

incluso si usted ha utilizado este

producto antes. Deje de usar y busque

atención médica inmediata si usted o un

niño en su cuidado desarrollan:

• piel pálida, gris o de color azul (cianosis)

• dolor de cabeza

• ritmo cardíaco rápido

• dificultad respirar

• fatiga o falta de energía

**Alerta de alergia:** No la use si tiene

alergia a los anestésicos con "caine", como

butacaina, benzocaína o procaina.

**Advertencia de dolor de garganta:** si el

dolor de garganta es severo, persiste

durante más de 2 días, está

acompañado o seguido de fiebre, dolor

de cabeza, náusea, vómitos, consulte a un

médico de inmediato. Si los síntomas de

la boca dolorida no mejoran en 7 días,

consulte al dentista o doctor de inmediato.

• para la dentición

• niños menores de 2 años de edad

• niños menores de 12 años de edad

**Advertencia de metemoglobinemia**

El uso de este producto puede causar

OPEN  
HERE